

CALENDARIO COLEOTTEROLOGICO

PER PALERMO E DINTORNI

DI

ENRICO RAGUSA

Or sono cinque anni, allorquando il Barone Rottenberg venne in Sicilia, (1869) visto l'esito felicissimo delle sue caccie di coleotteri, ed invogliato da queste ad aggiungere alla mia collezione di Lepidotteri quella dei Coleotteri, mi diedi a raccoglierne, e mano mano che ne conobbi i generi e le specie, li notavo con le date e le località precise ove li avevo raccolti.

Essendo la determinazione di quasi tutte le specie della mia raccolta stata corretta o riconosciuta valida da illustri entomologi, posso, ciò detto, garantirla e, copiando ora il tutto, indicare i giorni nei quali conviene ricercare la tale specie, o la tale altra. Pur troppo, spesso accade di cercare inutilmente quello che altri, più fortunati, raccolsero in altri tempi abbondantemente, e che ora, per la mancanza precisa della data o della località, più non si ritrova.

Quanto ciò sia necessario tutti lo sanno, e possano assicurarlo coloro che inutilmente van cercando quel dorato smeraldo che è il *Carabus Olympiae* Sella; ed io stesso posso asserirlo, che sicuro di dover trovare la *Cicindela Sicula* Redt. — *maura* L., la cercavo sempre in primavera in riva al mare o presso ai fiumi (ove a quell'epoca suol di consueto volare la *littoralis* e la *flexuosa*) e che finalmente la rinvenni nel Giugno e Luglio al Fiume Oreto, ed in poche ore ne raccolsi 50 esemplari.

Devo poi aggiungere che raramente riesce, cercando in Sicilia nella data epoca in cui trovasi una specie altrove, di ritrovarla,

giacchè sono tanti e poi tanti gli esempj contrarii, che non è proprio da fidarvisi.

Dirò per esempio di un genere che trovasi nelle isole del Mediterraneo, dei *Pachypus*.

In Sicilia, a Palermo, lo troviamo nell'Ottobre e nel Novembre; in Corsica in primavera. È strano ma è vero! — Andiamo ai *Cebrio*. Ogni specie ha la sua epoca fissa, e mentre il *melanocephalus* Germ. trovasi nell'Aprile e nel Maggio, il *Benedicti* invece rinviensi nell'Ottobre; il primo apparisce senza che vi siano forti piogge, il secondo senza di queste non si trova.

Molte altre specie hanno qui da noi una generazione doppia, e le vediamo in primavera ed in autunno. La generazione che passa l'inverno è costituita da coleotteri sempre più piccoli che d'ordinario e di colori poco vivi; quelle che invece hanno passato l'estate, offrono sempre individui più grandi e di colori assai più brillanti.

Tralascero di notare le specie comuni, che per altro ho già nominato nelle mie piccole pubblicazioni fatte nel nostro *Bullettino*.

Lo scopo di questo mio lavoretto è di rendere più facile la esplorazione al coleotterologo che percorrendo la Sicilia verrà a Palermo: la speranza una sola, ed è che verrà gradito.

Palermo, ottobre 1874.

GENNAIO.

Il giorno 6. Escursione sul Monte Pellegrino. — *Reicheia preacox*. Schaum. *Feronia crenata* Dej. *Bryaxis rufula* Rott. *B. Ragusae* Saulcy. *B. Helferi* Schmidt. *B. Opuntiae* Schm. *Crypharis Rosaliae* Rottb. che sarebbe secondo il Sig. Dottor G. Dieck (V. *Bull. ent.* Berl. 1873. pag. 422) il *Typhloporus deplanatus* Hampe — avendo però, ora per mezzo del Sig. E. Revelliere di Porto Vecchio comunicato allo stesso Dott. Hampe la *Rosaliae* ne sentiremo ben presto il parere che ci metterà in chiaro. *Cebrio Benedicti* 1 esp. ♂.

Il giorno 9. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Scydmaenus antidotus* Germ. *Ctenistes Kiesenvetteri* m. in litt. *Bruchus rufimanus* Boh. *Plinus Aubei* Boield *P. pulchellus* Boield, *P. obesus*, Lucas. *P. Si-*

culus. Ksw. *Parmena Solieri* Muls. e non *Hirsuta*, come l'avevo comunicata a tutti i miei corrispondenti. Diverse specie di *Stenosis* che il Sig. Baudi determinerà.

Il giorno 18. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Nebria Andalusica*. *Leptusa rugosipennis* Scriba. *Myrmedonia memnomia* Maerk. *Ocyopus pedator*. Grav. *Cartodere pilifera* Reitter, nov. sp.

Il giorno 24. Esc. nei dintorni di Ficarazzi. — *Scarites planus* presso il fiume. 1 Esp.

Il Gennaio è uno dei mesi più propizio per la caccia ai coleotteri in Sicilia, ed è giusto allora che sotto le pietre sui terreni umidi si trova quel piccolo mondo microscopico, e tutte quelle rare specie che inutile sarebbe cercare dopo.

FEBBRAIO.

Il giorno 1. Esc. alla Favorita. — *Calathus Solieri* Bassi. *Broscus potitus* Dej. *Carabus Faminii*. *Meloe* var. *corrosa*.

Il giorno 4. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Cleonus Siculus*. Fab.

Il giorno 9. sul muro del bastione al Foro Italico. — *Lebia cyathigera* Rossi, *Bembidium Siculum* Dej.

Il giorno 14. medesima località. — *Silpha granulata*, *Xantholinus linearis* Oliv.

Il giorno 16 Esc. al golfo di Mondello. — *Nebria complanata* *Scarites gigas* e *Ateuchus semipunctatus* e *variolosus*.

Il 21 Esc. sul Monte Pellegrino. — *Lixus augustatus* Fabr. *Oedichius paederinus*. Alle falde il *Rhizotrogus* che il Barone di Rottenberg nel suo cat. dei coleot. di Sic. trovò nel 1869 al 24 di Dicembre nella stessa località e lo crede il *R. Euphytus* Buq. Quest' insetto merita d'essere attentamente studiato giacchè vario è il parere dei naturalisti ai quali lo ho comunicato, e lo credono chi l'*insularis* Reiche, chi il *Gerardi* Bouq.

Il giorno 23 Esc. alla Favorita e Mondello. — *Meloe purpurascens* - sull'enforbia fiorita il *Telophorus praecox* Gené.

Bryaxis xanthoptera al fiume Oreto.

Il 24 Esc. al Monte Pellegrino. — *Pelobius Hermanni*, *Dasytes bipustulatus* e varietà.

Il 27 Villa Belmonte alle falde del Monte Pellegrino. — *Malloides bifurcatus*, *Malthinus dryocetes* Rot. *Attalus erythroderus*, *A. Sicamus*, *Panormitanus*. *m. Ebaeus collaris*, *Hypebaeus flavicollis*.

Quando nel Febbraio il tempo è bello ed il sole riscalda già le nostre campagne, allora si trovano molte specie che in altri anni, quando il tempo è freddo, non appariscono che nel Marzo ed anche nell'Aprile.

Per lo più, le *Enforbie* che crescono su tutta la metà del Monte Pellegrino, alla fine del Febbraio sono in piena fioritura, ed allora i *Malacodermi* vi albergano in masse.

MARZO.

Il giorno 11. Esc. alla Navurra presso Altavilla. — *Brachinus scopleta*, *B. bellicosus*, *B. bombardia*, *Chlaenius vestitus*. *C. agrorum*, Ch. var. *auricollis* e *Borgiae*. *Meloe murinus*.

Il giorno 20. Esc. alla Favorita. — *Meloe murina*, *M. rugosa*. *Brosicus politus*. *Telophorus rufifrons*. *Silpha granulosa*, *Stenosis*.

Il giorno 28. Esc. alle falde del Monte Pellegrino. — Il mio povero amico Giannetto Biraghi mi raccolse in quel di le *Nebrie Andalusiche* che trovansi riunite sotto i sassi, e con queste pure i *Rhizotrogus* da me trovati nel Febbraio.

Il mese di Marzo a causa dei forti venti che spirano e delle continue piogge, è generalmente un brutto mese per la caccia ai coleotteri.

APRILE.

Il giorno 7. Esc. alla Villa Belmonte. — *Dolichosomanobile* Illig. *Malachius geniculatus*, *M. spinipennis*, *M. parilis*.

Il giorno 11. Esc. nei dintorni di Ficarazzi. — *Pimelia Sardo*. *Dyschirius* due o tre specie che disgraziatamente perdetti. *Nebria* var. *Schreibersi*.

Il giorno 13. Esc. alle falde del Monte Pellegrino. — *Bembidium bipunctatum* L. *Xantholinus fulgidus* Trichodes var. *Dahlia*. *Attalus Panormitanus* m.

Il giorno 16. Esc. a Santa Maria di Gesù. — *Malthinus filicornis* Kiesv. *M. dryocetes*. Rottb. *Malthodes bifurcatus*. *M. procerulus* Kies. *M. facetus*. *Attalus Panormitanus*: m. *Dolichosoma protensum*, *D. smaragdinum*.

Il giorno 21. Esc. alla Favorita e Mondello. — *Erodius Neapolitanus*. *Scarites laevigatus* *Ateuchus pius*. *Scarites gigas*. *Anthicus fenestratus*. *Xantholinus fulgidus*.

Il giorno 25. Esc. a Bocca di Falco e falde di Monte Cuccio. — *Cryptocephalus rugicollis* e la var. *virgatus* (che per lo più sono sempre dei ㄗㄗ.) *Oedemera brevicollis*, *O. flavipes*. *O. virescens*.

Il giorno 26. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Dytiscus circumflexus*. *Eucnetes sticticus* *Pelobius Hermannii*. *Hyphydrus variegatus*. *Bembidium obtusum*. *B. Dahlia*.

Il giorno 27. Esc. a Mondello. — Trovai abbondante l'*Erodius Neapolitanus* che correva sulle sabbie presso al mare. Questa specie vive pochissimo tempo, giacchè appena il sole riscalda un pò la sabbia, si trova il litorale di Mondello sparso di corpi d'*Erodius* vuoti, essendone le formiche ghiottissime.

Il giorno 28. Esc. Navurra ed Altavilla. — *Cossyphus insularis*. *Drypta dentata*. *Tentyria grossa*. *Chlaenius agrorum*. *Siagona Europaea*.

È una vera festa il potere nell'Aprile fare delle escursioni nelle vicinanze di Palermo, la natura è tanto bella è tanto ricca, come può desiderarla e sognarla un'entomologo; i più ricchi tappeti di verzura offrono migliaia d'insetti all'occhio, ed alla retina, indispensabile per poter snidare dalle erbucce tutto quel mondo di gemme che vi si asconde.

MAGGIO.

Il giorno 2. Esc. alla Bagheria e dintorni. *Anthaxia manca*. *A. lucens*. *Phytoecia virgula*. *P. Rustmana*. *P. Virescens*.

Il giorno 5. Esc. sul Monte Catalfano. — *Pachychila Dejeanii*.
Mylabris variabilis. *M. 4 punctata*.

Il giorno 8. Esc. alle falde del Monte Pellegrino. — Il *Rhizotrogus* già preso nel Febbraio e nel Marzo, *Phytoecia rufimana*.
P. molybdaena, *Microctilodes* nov. gen. Ragusae Reitter.

Il giorno 10. Tenuta Radali, al Giardino Inglese. — *Chryso-
mela hyacinthina*. *C. Schottii*, e diversi malacodermi.

Il giorno 15. Esc. alla Favorita. — *Acmoedera virgulata*. *Sphenoptera gemellata*. *Mylabris distincta*. *Chlythra*. *Bembidium Siculum*. *Sphenoptera geminata*. *S. metallica*.

Il giorno 17. a Bocca di Falco in una grotta *Trechus minutus*
e *Tachys Fockii*.

Dal giorno 20 al 24. Esc. al Bosco della Ficuzza, sulla Busambra e dintorni. Epoca della *Lytta vesicaloria*, che danneggia orribilmente gli Oliveti e quanto havvi di verde sugli alberi. — Elenco delle specie raccolte dal 23 al 25 l'anno 1870, dal 20 al 24 il 1871 e dal 12 al 15 Giugno 1872. *Carabus Lefebvrei* 1 esemplare. *Polycticus fasciolatus*. *Dromius fasciatus*. *D. linearis*. *Lebia Turcica*. *Chlaenius crysocephalus*. *Dinodes rufipes*. *Anchomenus prasinus*. *Feronia cuprea*, *F. splendens*. *Percus Sicula*. *Stenotophus Teutonius*. *Myrmedonia ruficollis*. *M. memnonia*. *Quedius impressus*. *Q. scintillans*. *Q. rufipes*. *Philanthus sordidus*. *P. fimetarius*, *P. ebeninus*, *P. mimulus*. *P. splendidulus*. *Latrobium multipunctatum*. *Adelops tarsalis* an nov. sp. *Hister pustulosus*. *Corticus foveicollis*. *Rhizotrogus aestivus* ed un'altra specie. *Anthaxia manca*, *A. cyanicornis*. *A. saliceti*. *A. Millefolii*. *A. cichorii*. *A. grammica*. *Ptosima flavoguttata* e var. *II maculata*. *Acmoedera taeniata*. *Chrysobothrys Solieri*. *Coraebus Rubi*. *Agrilus sinuatus*. *A. biguttatus*. *A. viridis*. *A. augustulus*. *A. scaberrimus*. *A. derasofasciatus*. *A. Solieri*. *A. roscidus*. *A. auricollis*. *Trachys pygmaeus*. *F. pumilus*. *Adelocera carbonaria*. *Elater Pomonae*. *Cardiophorus ulcerosus*. *C. argiolus*. *C. collaris*. *C. Eleonorae*. *C. rufipes*. *Melanothus dichrous*. *Helodes livida*. *Cyphon variabilis?* *Hydrocyphon deflexicollis?* *Telephorus haemorrhoidalis*. *Rhagony. straminea*. *Drilus flavescens*. *Attalus lateralis*. *Dasytes algiricus*. *C. griseus*. *D. flavipes*. *D. aenei*.

ventris. *Haplocnemus crenicollis*. *H. marginatus*. *H. Trinacriensis*. *m. H. Siculus*. *H. pectinicornis*. *Ochina Hederae*. *Pedinus Ragusae* Ksw. in litt. *P. punctatostriatus*. *Cisteta furruginea*. *Notoxus monocerus*. *Anthicus floralis*. *A. anthracinus*. *A. hispidus*. *A. vitatus*. *Mordella Ragusae Emery* e var. *M. bipunctata*. *M. viridiscens*. *Mordellistena episternalis*. *M. grisea* *M. stenidia*. *M. testacea*. *Anaspis flava*. *A. maculata*. *A. frontalis*. *A. ruficollis*. *Meloe violacea*. *M. Uralensis*. *Lytta segetum*. *Asclera haemorrhoidalis*. *Oedemera caerulea*. *Mycterus unbellatarum* *Platytarsus aurosus*. *Phyllobius sinuatus*. *P. Piri*. *P. subdentatus*. *Metallites Sicanus*. *M. scutellaris*. *Polidrosus sericeus* *P. armipes*. *Brachycerus Mauritanicus* *B. undatus*. *Cleonus obliquus*. *C. cinereus*. *Dorytomus costirostris*. *Smicronyx cyaneus*. *S. corsicus*. *Balaninus glandium*. *B. turbatus*, *B. Brassicae*. *Anthonomus Piri*. *A. ornatus*. *Bradybates Creutzeri*. *Orchestes Alni*, *O. Ilicis*. *O. ferrugineus*. *Oryx nitidus*. *Miccotrogus cuprifer* *Tychius meliloti*. *Sibynia Attalica*. *S. primita*. *S. niveivittis*. *Apion Genistae*. *Rhynchites giganteus*. *R. auratus*. *R. Bacchus*. *R. ruber*. *R. planirostris*. *R. Betuleti*. *Brachytarsus* Sp? *Clytus scalaris*. *C. Rhamni* *C. trifasciatus*. *C. 4 punctatus*. *C. massiliensis*. *C. gibbosus*. *Callimus decorus*. *Cryptocephalus signaticollis*. *C. Pistaciae* *C. macellus*. *C. Politus*. *Pachybrachys hieroglyphicus*. var. *P. fulvipes*. *P. histrio* *Haltica Coryli*. *H. anepelophaga* *H. versicolor*. *H. podagrica*. *H. semirufa* *H. atra*. *H. obscurella*. *Pectroscelis chlorophana* *Coccinella 14 pustulata*. *C. 12 pustulata* *C. 11 punctata*. *C. 7 punctata*. *C. 2 punctata*. *C. mutabilis*. *C. bisbipustulatus*. *Halyzia conglobata*. *H. 12 punctata*. *Epilachna globosa* ed altri generi e specie ancora da studiarci.

Il giorno 28 passeggiata all'Orto Botanico. — *Aromia ambrosiaca* *Cebrio* ♀? *Laccobius minutus*. *L. viridiceps*. *L. nigriceps*. *L. alternus* *Limnebius truncatulus*. *L. picinus*. *Helophorus granularis*. *Ochthebius bicolon*. *O. exaratus*.

Il giorno 29. Esc. al Fiume Oreto. — *Heterocerus* 2 specie? *Omophron limbatus*. *Cryptohypnus* 4 *guttatus*. *C. minutissimus*. *S. lapidicola*. *Bembidium maculatum*. *B. ripicola*. *B. Andreae*. *B. Callosum*.

L'escursioni nel mese di Maggio non sono così piacevoli come quelle dell'Aprile, a causa del forte caldo che comincia a farsi sentire, pur non di meno ovunque c'è vita, e si soffre con piacere guardando le belle catture che si sono fatte.

GIUGNO.

Il giorno 2. Esc. al Fiume Oreto. — *Cicindela maura*. A casa mia sul muro due o tre *Malthinus rubricollis* Baudi. ed il giorno 4 in una cameruccia ove teniamo dei ramoscelli di sommacco secco correva su tutti i muri *Gracilia pygmaea*. 1 *Hylotrypes banulus* ed in un giardino *Phymatodes variabilis*.

Il giorno 5. Esc. alle grotte delle falde del Monte Pellegrino, — *Sphodrus Algerinus*. *S. leucopthalmus*. *Quedius fulgidus*.

Il giorno 11. Esc. a Mondello. — Dal tamarindi battendolo forte, *Anoxia Sicula*. ♂ Che dal 70 in quà avrò preso in una 30^a di esemplari, mentre la ♀ è rarissima, e non ne posseggo che un solo esemplare trovato morto sulla sabbia. *Colotes maculatus*. *Crepidodera impressa*. *Coniatus Tamarisci*. *Nanophyes Chevrieri*. *N. Rubricus*. *N. Tamaricis*. *N. pallidus*. ed altri al 12 al 23 (1870) Esc. alle Madonie..

Il giorno 16. Esc. al Fiume Oreto. — *Cicindela maura* abbondante *Anomala vitis*. *Cebrio*. sp?

Il giorno 23. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Tillus transversalis*. *Acmoedera lanuginosa* *Dasytes flavescens*. *Sphenoptera metallica*. *Cetonia floralis*. *Larinus Cirsii*. *L. bucinator*. *L. flavescens*. *L. planus*.

Il giorno 25 sui muri della strada che conduce alla Favorita. — *Ludius Guillebellii*.

LUGLIO.

Il giorno 6. alla Favorita. — *Hypera socialis*. *Mordella basalis*. Dal 30 Giugno al giorno 11 Luglio (1871) Esc. alle Madonie e Ca-

ronie dal 28 al 5. (1872) Esc. alle Madonie e dal 21 al 27. Esc. al bosco della Ficuzza.

AGOSTO.

Il giorno 18. Esc. a Mondello. — *Mezium sulcatum*. *Gibbium scotias*. *Scarites laevigatus*. *Phaleria cadaverina*. *Cicindela littoralis* var. *Cicindela flexuosa*. *Crypticus gibbulus*. *Apristus albonotatus*. (Oreto).

SETTEMBRE.

Il giorno 6. Esc. all'Oreto. — *Lyonychus albomaculatus*. *L. subaeneus*.

Il giorno 12. a casa nello stanzino del Sommaco. — *Hesperophanes Sericeus* e *H. pulverulentus*. Er.

Il giorno 18, *Corynetes rufipes*. *Otiorhynchus aurifer*.

Il giorno 29. Esc. alla Favorita e Mondello. — *Scarites gigas*. *Ateuchus pius*. e *variolosus*. *Cicindela littoralis*. *Carabus morbillosus* e var. *Servillei*. *Ditomus dama*.

Il giorno 30. alla Marina sui muri dei bastioni. — *Scymnus includens*. *Phloeopagus spadix*.

OTTOBRE.

Il giorno 3. Esc. al Fiume Oreto. — *Scarites planus*. 1 Es. *Pimelia Sardoia*. *Capnodis cariosa*, e molti coleotteri acquatici.

Il giorno 11. Esc. a Santa Maria di Gesù. — *Chrysomela Sparshalli*. *Corynetes rufipes*. *Lathrobium stalicinum*.

Il giorno 13. Esc. al Giardino Inglese, Favorita, e Mondello, durante una forte pioggia andai a trovare molti *Cebrio Benedicti*? che volavano lentamente e posavansi sul terreno e sulle piante.

Il giorno 18. Esc. alla Favorita fatta espressamente per andarci a catturare il *Pachypus caesus*. ne presi 8 ♂♂ 1 ♀; il

giorno 20. 30 ♂♂ ed 1 ♀. Il 22 4 ♂♂. Il 27 3 ♂♂. Il 30 più nessuno e questo fu l'anno 1871. Nel 1872 il giorno 16 2 ♂♂ il 18 31 ♂♂. Nel 1873 il 18 4 ♂♂ il 22 2 ♂♂. Nel 1874 il giorno 16-136 ♂♂ e 2 ♀♀. — da queste date e numeri si vede che il momento più propizio per prenderne molti, è dal 15 al 25 Ottobre.

Il giorno 27. feci buona provvista di *Timarcha pimeloides* essendo l'Ottobre il mese ove questa specie comune tutto l'anno si trova abbondantissima.

Alla Favorita suol pure volare nelle ore mattutine la *Spenoptera gemellata* e trovasi sotto le pietre il *Broscus politus*.

Il giorno 28. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Ocytus pedator*. *Astrap. ulmi*. *Otiorhynchus affaber*. molto comune. *Lilhocharis* v. *Sicula*. *Licinus Siculus*. *Ptinus pulchellus*. *Tychius Jacquelinii*. *Bryaxis Ragusae*.

Il giorno 16. Esc. nei dintorni del Fiume Oreto. — *Trimnium Siculum*. *Euplectus* Sp? *Scyd. Helseri*. *Chrysomela Sparshalli*. *C. menthastri* *Calathus* var. *ochropterus*. *Pedinus fallax*. *Syncaelyptasetosa*. *Carabus morbillosus*. *Otiorhynchus cribricollis*. *Trachyphloeus nodipennis*. *Broscus politus*- *Euthia Schaumi*. *Aphanisticus Siculus*. ed un *Pselafus* a me ignoto.

Il giorno 30. Esc. al Fiume Oreto. — Sulla sabbia sotto le pietre *Nebria Andalusica*. *Chlaenius sploliatus*. *C. auricollis* ed un *Chlaenius* nov. sp. (*Oreteus Rag.*) *Tachys minutus* comunissimo. *Olisthopus fuscatus*.

Dopo l'eterna estate ecco che l'Ottobre ci offre centinaia di buone specie, che val la pena di andare a cercare sulle alture del Pellegrino, o sulle rive del Fiume Oreto alla Guadagna; non avendone il tempo un'ora di passeggiata lungo il bastione della Marina di Palermo può esser fruttuosissima, giacchè nella fessura del muro vi si nascondono migliaia di piccoli coleotteri non sempre sgraditi.

NOVEMBRE.

Il giorno 2. Esc a Monreale. — *Chrysomela* sp? *Timarcha sicelidis*, *Choleva angustata*. *Leistus spinibarbis*. *L. fulvibarbis*. *Stenosis angustata*.

Il giorno 7. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Aumarops Aubei*.
Crypharis Rosaliae? *Dysch. praecox*. *Zuphium Chevrolatii*.

Il giorno 13. Esc. alla Favorita e Mondello. — *Carabus Faminii*. *Chrysomela atra*. *Pachypus caesus*. (1870) *Calathus Solieri*
C. circumseptum. *Nebria complanata*. *Stenus biguttatus*. *Copris hispana*. *Pentadon punctatus*. *Helops nanus*. *H. pallidus*. *H. jun-
corum*. ed altri.

Il giorno 20. all'Oreto. — Uno stupendo *Mycetoporus* sp?

DECEMBRE.

Il giorno 3. Esc. sul Monte Pellegrino, molti *Ophonus colum-
binus*. *O. rotundicollis*. *O. Cribricollis*. *O. pumilio*. e *planicollis*.

Il giorno 17. Esc. sul Monte Pellegrino. — *Langelandia?* (*Dieck
Reicheia* sp?) *Ctenistes Kiesenwetterii*. *Plinus variegatus*, *P. Aubei*
P. obesus. *Cleonus Siculus*. *Feronia crenata*. (*Dieck Cebrio Be-
nedicti?*) *Cassida lata*. *C. depressa*. *C. oblonga*.

Il giorno 29. Esc. alla Navurra. — *Lacon crenicollis?* presso
al Fiume che va ad Altavilla, ed il *Scleron armatum*. *Corticus
foveicollis*. *Lebia fulvicollis*. *Harpalus fulvus*. *H. serripes*. *H. Si-
culus*. *Siagona Europea*.

Molte escursioni fatte durante l'anno con pessimi risultati,
non li ho notati, giacchè è proprio fatica perduta l'andare alle
rovine di Solunto, oppure sul Monte Cuccio, ove i coleotteri sono
molto rari, e quei pochi che si raccolgono comunissimi.

In ultimo dirò che esiste presso Palermo una località ove fu
trovata la *Cardiomeria Genei*. località che fin' ora è a me ignota.
